

厚真町 子どもの予防接種一覧表

R5.4.1修正版

- ＜接種場所＞ あつまクリニック(要予約)
- ＜日 時＞ ◆未就学児(予防接種専用時間)・・・毎週水曜日14:00～15:00
◆小学生～19歳・・・毎週月・金曜日9:00～12:00/14:00～17:00、毎週水曜日9:00～12:00/15:00～17:00
- ＜持 ち 物＞ ①母子手帳、②QRコードシール、③予診票(必ず事前に記入してください)

定期予防接種 * 下記の期間で無料で接種することができます

種類	対象者(接種できる年齢)	接種開始年齢 (※開始年齢により、 接種回数が異なります)	接種回数と間隔	備考
【不】 Hib(ヒブ)	生後2カ月 ～60カ月(5歳)未満	★標準的な接種 生後2カ月～7カ月未満	初回 3回(27日以上あけて) 追加 1回(初回終了後7カ月以上あけて)	※初回2・3回目は1歳まで(追加接種は可)
		生後7カ月～1歳未満	初回 2回(27日以上あけて) 追加 1回(初回終了後7カ月以上あけて)	※初回2回目は1歳まで(追加接種は可)
		1歳～5歳未満	1回	
【不】 小児用 肺炎球菌	生後2カ月 ～60カ月(5歳)未満	★標準的な接種 生後2カ月～7カ月未満	初回 3回(27日以上あけて) 追加 1回(初回終了後60日以上あけて、1歳以降に)	※初回2・3回目は2歳まで(追加接種は可) ※初回2回目が1歳を超えた場合は3回目の接種は行わない(追加接種は可)
		生後7カ月～1歳未満	初回 2回(27日以上あけて) 追加 1回(初回終了後60日以上あけて、1歳以降に)	※初回2回目は2歳まで(追加接種は可)
		1歳～2歳未満	2回(60日以上あけて)	
		2歳～5歳未満	1回	
種類	対象者(接種できる年齢)	標準的な接種年齢	接種回数と間隔	備考
【経口生】 ロタウイルス (ロタリックス)	生後6週 ～24週未満	1回目は必ず、生後2カ月 ～生後14週6日までに接 種してください！	2回(27日以上あけて)	※R2.10.1～定期接種化
【不】 B型肝炎	生後2カ月 ～1歳未満	生後2カ月～9カ月未満	初回 2回(27日以上あけて) 追加 1回(1回目の接種から139日以上あけて)	
【不】 四種混合 ジフテリア・破傷風 百日ぜき・ポリオ	生後2カ月 ～90カ月(7歳6カ月)未満	生後2カ月～1歳未満 1期初回(3回目)終了後 12～18カ月後	1期初回 3回(20～56日あけて) 1期追 1回(1期初回(3回目)終了後12～18カ月あけて)	※R5.4.1～2か月に対象者拡大
【注射生】 BCG	1歳未満	生後5カ月～8カ月未満	1回	
【注射生】 麻疹・風疹 (MR)	1期 1歳～2歳未満	1歳になったらできるだけ早 めに	1期 1回	
	2期 5歳以上7歳未満で 翌年度小学校に就学する児	小学校就学前の1年間 (年長)	2期 1回	
【注射生】 水痘 (みずぼうそう)	1歳～3歳未満 ※既に罹患した場合は対象外	1回目:1歳～1歳3カ月まで 2回目:1回目から6～12カ 月後	2回(6～12カ月(最低3カ月以上)あけて)	
【不】 日本脳炎	1期 生後6カ月 ～90カ月(7歳6カ月)未満	3歳～4歳未満	1期初回 2回(6～28日あけて)	
		4歳～5歳未満	1期追加 1回(1期初回終了後、約1年(最低6カ月)あけて)	
	2期 9歳～13歳未満	9歳～10歳未満	2期 1回	
【不】 二種混合 (四種混合2期) ジフテリア・破傷風	11歳～13歳未満	11歳～12歳未満 (小学6年生)	1回	
【不】 ヒトパピローマ ウイルス感染症 (9価シルガード)	小学6年生 ～高校1年生の女子	中学1年生	2回(6カ月(最低5カ月)以上あけて) ※1回目接種が15歳を超えた場合は3回接種(2カ月以上あけて2回接種、その後1回目から6カ月以上あけて1回接種)	※R5.4.1～9価シルガード定期接種化 ※過去に接種歴のある方は原則同一ワクチンを使用します

任意予防接種 * 町助成対象(無料):1歳～3歳未満で1回目の接種のみ

種類	対象者(接種できる年齢)	標準的な接種年齢	接種回数と間隔	備考
【注射生】 おたふくかぜ	1歳以上 ※既に罹患した場合は対象外	1歳以上 ※2回接種する場合の2回目は、小学校就学前の1年間(日本小児学会)	1回 ※日本小児学会では2回接種が推奨されています	※2回目接種の場合、1回目であっても年齢が町助成対象外の場合は、全額自己負担となります。

* 本来、全額自己負担の予防接種ですが、厚真町独自助成により無料で接種することができます

ワクチンの接種間隔について * 以下の2点を必ず確認しましょう

①次に別の種類のワクチンを打つ時・・・注射生ワクチンどうしは27日以上あける。それ以外は原則接種間隔をあげなくてよい(R2.10.1～適用)。

- * 【不】不活化ワクチン 【注射生】注射で接種する生ワクチン(※次に注射生ワクチンを接種する場合は間隔に注意)
【経口生】飲むタイプの生ワクチン

②次に同じ種類のワクチンを打つ時・・・上記の表のとおり間隔をあける